

Алгоритм для определения стадии ХБП у кошек

Анамнез и/или ветеринарный осмотр дающий основание предложить у пациента ХБП

Уровень креатинина крови

Креатинин
<140 ммоль/л
< 1.6 мг/дл

Креатинин
140 – 250 ммоль/л
1.6 -2.8 мг/дл

Креатинин
>250 ммоль/л
>2.8 мг/дл

Удельный вес мочи

Существуют достоверные доказательства наличия ХБП

Достоверные доказательства наличия ХБП отсутствуют

Удельный вес мочи

<1,035

≥1,035

Пре- или пост-ренальная азотемия

Ренальная азотемия

Стадия I

Подстадия по UP/C и АД

Рентгенография, УЗИ, UP/C, АД и бакпосев мочи

Назначение планового лечения для пациентов с I стадией

Рентгенография, УЗИ, UP/C, АД и бакпосев мочи

Норма: переоценить в течение 2 месяцев.
Имеются отклонения от нормы: **стадия II**
Подстадия по UP/C и АД

Начните курс лечения

Клиническая оценка

Если присутствуют системные патологии, скорректируйте их и переоцените состояние в течение 6 месяцев.

III или IV стадия

Подстадия по UP/C и АД

Начните курс лечения

Проведите переоценку через 2-3 месяца. Затем проводите определение каждые 3 месяца, если уровень креатинина возрастает, и каждые 6 месяцев, если уровень креатинина стабилен.

Немедленно определите и проведите коррекцию патологического состояния